

Prospect: Informații pentru utilizator

INFLUCID®

comprimate

Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luăți întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Influcid și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Influcid
3. Cum să luați Influcid
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Influcid
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Influcid și pentru ce se utilizează

Influcid este un medicament homeopat pentru tratamentul și prevenția infecțiilor febrile asemănătoare gripei și al altor infecții virale acute ale tractului respirator superior precum și pentru tratament suportiv în caz de gripă.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Influcid

Nu luați Influcid

- Dacă sunteți alergic la Eupatorium perfoliatum sau la alte plante din familia asteraceae/compositae, la oricare dintre celelalte substanțe active sau la oricare dintre componentele acestui medicament (prezentate la secțiunea 6).

Atenționări și precauții

Adresați-vă medicului dumneavoastră și nu mai luați Influcid dacă

- nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău,
- apar alte manifestări îngrijorătoare,
- febra persistă sau are valori peste 39°C.

Copii

Influcid nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 1 an, deoarece nu există suficientă experiență la acest grup de vârstă.

Influcid împreună cu alte medicamente

Nu au fost observate interacțiuni cu alte medicamente. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă utilizați, ați utilizat recent sau veți utiliza alte medicamente.

Influcid împreună cu alimente și băuturi

Efectul unui medicament homeopat poate fi influențat nefavorabil de factori generali ce țin de stilul de viață, precum și de consumul de stimulante, alcool sau fumat.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Influcid nu are influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Influcid conține lactoză (glucid din lapte) și amidon de porumb

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la anumite categorii de glucide vă rugăm să întrebați înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament se poate administra la persoanele cu boală celiacă. Pacienții cu alergii la grâu (diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament.

3. Cum să luați Influcid

Luăți întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. Dozele recomandate sunt:

Adulți: în afecțiuni acute, 1 comprimat la interval de 1 oră, până la maxim 12 comprimate pe zi, până la apariția ameliorării simptomelor. În cazul continuării tratamentului, se utilizează 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

Pentru prevenția infecțiilor, luați 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

Utilizare la copii și adolescenți

Copii cu vârsta de la 1 an până la 11 ani: în *afecțiuni acute*, 1 comprimat la interval de 2 ore, până la maxim 8 comprimate pe zi, până la apariția ameliorării simptomelor. În cazul *continuării tratamentului*, se utilizează 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste: în *afecțiuni acute*, 1 comprimat la interval de 1 oră, până la maxim 12 comprimate pe zi, până la apariția ameliorării simptomelor. În cazul *continuării tratamentului*, se utilizează 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

Pentru *prevenția* infecțiilor, la copii cu vârsta de la 1 an până la 11 ani se utilizează 1 comprimat de 3 ori pe zi iar pentru la adolescenții cu vârsta de 12 ani și peste se utilizează 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

Comprimatele trebuie luate să se dizolve încet în gură. Pentru copii mici comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Nu trebuie să luați acest medicament împreună cu alimente și băuturi. Trebuie păstrat un interval de cel puțin o jumătate de oră față de mese.

Dacă luați mai mult Influcid decât trebuie

Nu sunteți de așteptat efecte nocive în caz de supradozaj.

Dacă uitați să luați Influcid

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Influcid

Nu sunteți de așteptat efecte nocive.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazuri foarte rare pot să apară reacții de hipersensibilitate, de exemplu erupții trecătoare pe piele și tulburări gastrointestinale.

Notă: administrarea unui medicament homeopat poate determina agravarea temporară a simptomelor existente (agravarea inițială). În aceste cazuri, între-rupeți administrarea medicamentului și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistenței medicale. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la



Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Influcid

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Influcid

- Substanțele active sunt: Aconitum trit. D3 25 mg, Gelsemium trit. D3 25 mg, Ipecacuanha trit. D3 25 mg, Phosphorus trit. D5 25 mg, Bryonia trit. D2 25 mg, Eupatorium perfoliatum trit. D1 25 mg per 1 comprimat (250 mg).
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, stearat de magneziu, amidon de grâu.

Cum arată Influcid și conținutul ambalajului

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 20 comprimate

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 20 comprimate

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

ALPEN PHARMA GmbH

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,
Germania

Fabricantul

Deutsche-Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germania

sau

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3

77736 Zell am Harmersbach, Germania

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2022.

